



SMIV

นายแพทย์อัครพัฒน์ เตชะราชกุล

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ขอนแก่น



ขอบเขตของเนื้อหา



- คำจำกัดความพฤติกรรมความรุนแรง
- การวินิจฉัยทางจิตเวช และความรุนแรง
- การประเมินและการดูแลผู้ป่วยก้าวร้าว
- การประเมินความเสี่ยงของความก้าวร้าว
- การจัดการรักษาผู้ป่วยก้าวร้าว
- การรักษาต่อเนื่อง

พฤติกรรมความรุนแรง

คำจำกัดความ: การเจตนาใช้กำลัง
ทางกายหรืออำนาจเพื่อข่มขู่ต่อ
ตนเอง ผู้อื่น หรือต่อกลุ่มบุคคล
หรือชุมชนอื่น



วินิจฉัยทางจิตเวช และความรุนแรง

วินิจฉัย	% ความรุนแรง
Drug use disorder	34.7
Alcohol use disorder	24.6
Schizophrenia	12.7
Major depression	11.7
Bipolar disorder	11
No disorder	2.1

วินิจฉัยทางจิตเวช และความรุนแรง

- ความรุนแรงต่อตนเอง (Self-directed violence)
- ความรุนแรงต่อผู้อื่น (Interpersonal violence)
- โรคทางจิตเวชและฆาตกรรม (Mental disorders and homicidal behavior)
- ความผิดปกติทางระบบประสาทของฆาตกร (Neurological abnormalities in murderers)



การประเมินและการดูแลผู้ป่วยกำเริบ


ประเมินว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วย
โรคทางกาย, โรคทางสมอง หรือผลจาก
ยาเสพติด เพื่อการวินิจฉัยแยกโรค



การประเมินความเสี่ยงของความก้าวร้าว

เป็นการประเมินเพื่อใช้ในการวางแผนในการดูแลรักษา โดยสิ่งที่ควรประเมิน ได้แก่

- ความตั้งใจ (Violence ideation)
- ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic)
- ประวัติในอดีต (Past history)
- สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความเครียด (Stressors)



การจัดการรักษาผู้ป่วยก้าวร้าว

1. การสนทนา

- ลดความเสี่ยง: ลดความเสี่ยงของ ความรุนแรง, การเลือกตำแหน่งห้องตรวจ, แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- เจรจาต่อรอง: เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม, เจรจาด้วยความนุ่มนวล
- ประเมินการจัดการ: ประเมินสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยก้าวร้าว



การจัดการรักษาผู้ป่วยก้าวร้าว

2. การผูกมัดผู้ป่วย (Physical Restraint)


- ข้อบ่งชี้ในการผูกมัด: มีพฤติกรรมก้าวร้าว อาละวาด และ
ต้องได้รับการรักษาโดยด่วน, มีความเสี่ยงในการควบคุม
พฤติกรรมไม่ได้



การจัดการรักษาผู้ป่วยก้าวร้าว


3. การใช้ยาควบคุม (Pharmacological Restraint)

- ยากลุ่มคลายกังวล (Anxiolytic drug)
- ยาต้านอาการทางจิต (Antipsychotic drug)



การรักษาตนเอง

1. รับผู้ป่วยเข้าในโรงพยาบาล (Hospitalization)
2. การใช้ยาทางจิตเวช (Pharmacotherapy)
3. การรักษาทางจิตสังคม (Psychosocial treatment)





Thank you